

تأثیر زمان و میزان کاهش تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی چغندر قند

Effects of Plant Population Reduction Time and Rate on Sugar Beet Yield and Quality

سعید صادق‌زاده حمایتی^۱، محمد خداگو ایبانه^۲ و پرویز فصاحت^۳

۱ و ۳- استادیار، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
۲- کارشناس ارشد، وزارت جهاد کشاورزی، تهران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۳/۳ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۹

چکیده

صادق‌زاده حمایتی، س.، خداگو ایبانه، م. و فصاحت، پ. ۱۳۹۶. تأثیر زمان و میزان کاهش تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی چغندر قند. مجله به‌زراعی نهال و بذر ۲-۳۳: ۲۴۸-۲۳۱. 10.22092/sppj.2018.116418

تراکم بوته عامل مهم و مؤثری بر عملکرد و کیفیت محصول ریشه چغندر قند محسوب می‌شود. به دلیل اهمیت زمان ایجاد تراکم استاندارد در مزرعه و ارزیابی نحوه تأثیر تغییرات زمان و شدت کاهش تراکم بوته در طول فصل رشد روی عملکرد کمی و کیفی چغندر قند رقم دورتی (Doretta) در دو سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در کرج، این آزمایش به شکل فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. عوامل مورد آزمایش شامل زمان کاهش تراکم بوته (در چهار سطح ۳۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ روز پس از کاشت) و سطوح نهایی تراکم بوته (در شش سطح ۱۲/۵، ۹/۳۷۵، ۸/۳۷۵، ۶/۲۵، ۴/۱۲۵ و ۳/۱۲۵ بوته در مترمربع) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که زمان کاهش تراکم بوته عمده‌تأ روی محصول تولید شده در هر بوته اثر معنی‌داری داشت و بیشترین عملکرد ریشه (۱/۵۳-۱/۴۹ کیلوگرم در بوته) و شکر خام (۰/۲۱-۰/۲۰ کیلوگرم در بوته) با کاهش تراکم بوته طی ۶۰-۳۰ روز پس از کاشت حاصل شد. بیشترین عملکرد در بوته (۱/۷۴-۱/۹۲ کیلوگرم ریشه و ۰/۲۶-۰/۲۴ کیلوگرم شکر خام) و در واحد سطح (۹۵/۵۴-۸۹/۸۱ تن ریشه در هکتار و ۱۲/۹۷-۱۲/۰۶ تن شکر خام در هکتار) به ترتیب برای تراکم ۳/۴-۴/۵ و ۷/۷-۱۰/۲ بوته در مترمربع حاصل شد. در مجموع، کاهش تعداد بوته طی ۶۰-۳۰ روز پس از کاشت و ایجاد تراکم معادل ۸/۴-۱۲/۵ بوته در مترمربع متضمن دستیابی به حداکثر عملکرد محصول در مناطق آب و هوایی معتدل (مشابه کرج) بود.

واژه‌های کلیدی: چغندر قند، تراکم بوته، زمان تنک، عملکرد، شکر خام.

مقدمه

عملکرد قند در چغندر قند تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که عمده‌ترین عوامل مؤثر میزان تشعشع خورشیدی و دمای مناسب طی مراحل مختلف رشد گیاه است (Schiphouwer, 1991). تحقیقات نشان داده است که رشد و عملکرد چغندر قند به‌طور مستقیم نسبتی از مجموع تشعشع دریافتی توسط برگ است و از سوی دیگر، میزان رشد اولیه برگ تا زمان پوشش کامل سایه‌انداز به‌طور مستقیم توسط دمای هوا کنترل می‌شود (Scott and Jaggard, 1992). گیاهان برای رشد نیازمند جذب و احیاء گاز کربنیک با استفاده از تشعشع خورشیدی هستند و بنابراین، عملکرد محصولات زراعی در بیش‌تر موارد، رابطه خطی با مقدار تشعشع خورشیدی دریافت شده دارد (Clover et al., 2001)؛ ضریب رگرسیونی محاسبه‌شده بین مجموع تشعشع دریافتی با عملکرد قند و عیار قند همبستگی مثبت و معنی‌داری نشان داده است (Ohtake et al., 1997). عمده‌ترین محدودیت چغندر قند در دست‌یابی به عملکرد حقیقی، ناتوانی در جذب تشعشع در اوایل فصل رشد گزارش شده است (Scott and Jaggard, 1978b). با وجود آن که سطح برگ و دریافت تشعشع در ابتدای دوره رشد چغندر قند کم است، افزایش تشعشع تابیده به واسطه حداکثر ظرفیت

فتوسنتزی موجود به‌ازای هر واحد سطح برگ در ۶۴ روز ابتدای دوره رشد محصول (Hadanova, 1975)، می‌تواند تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در افزایش عملکرد محصول داشته باشد (Kenter et al., 2006). زمان موردنیاز برای این که گیاه بتواند کل نور موجود را دریافت کند به فاصله ردیف و تراکم بوته (Ball et al., 2000) بستگی دارد. بنابراین، جهت به حداکثر رساندن دریافت تشعشع، تراکم بوته و ایجاد فاصله مناسب بین بوته‌ها مهم و بحرانی محسوب می‌شود. نشان داده شده است که در مناطق سرد، طی تراکم‌های ۷۵ و ۳۷ هزار بوته در هکتار پس از حصول حداکثر پوشش سایه‌انداز به ترتیب ۸۹ و ۷۵ درصد از تشعشع دریافت شد.

کاشت بذر در حداقل تراکم ممکن برای دست‌یابی به حداکثر عملکرد (تراکم مطلوب) موجب کاهش هزینه‌های کاشت می‌شود (Board, 2000). تراکم‌های پایین‌تر از حد مطلوب، موجب کاهش عملکرد و افت خصوصیات کیفی ریشه‌های مورد برداشت و تراکم‌های بیش از حد مطلوب باعث ایجاد اختلال در حذف قسمت‌های هوایی بوته و طوقه در زمان برداشت، تولید ریشه‌های کوچک با سیلوپذیری پایین و افزایش انتقال خاک طی برداشت در خاک مرطوب می‌شود (Cattanach, 1993).

در شرایط مطلوب، رشد چغندر قند و انباشت قند در این گیاه، به‌طور کامل به‌وسیله شرایط

غالب آب و هوایی (تشعشع و درجه حرارت) و ویژگی‌های گیاهی نظیر تراکم بوته تعیین می‌شود (Vandendriessche, 2000). البته، در گیاهان ریشه‌ای نحوه واکنش به عوامل زراعی نظیر تراکم بوته به آستانه واکنش توسعه مخزن نسبت به منبع بستگی داشته و متفاوت است (Hole et al., 1984). در تراکم‌های بالاتر از حد مطلوب، سایه‌اندازی متقابل بوته‌های هم‌جوار با کاهش دریافت تشعشع، موجب محدودیت در تولید ماده خشک می‌شود (Scott and Jaggard, 1993). مطالعات انجام شده حاکی از افزایش سطح برگ به‌ازای واحد سطح زمین طی کشت زود هنگام در تراکم‌های بالای بوته است (Sogut and Aröglu, 2004). مطالعات متعدد نیز نشان داده‌است که تراکم بالای بوته با میزان کم آفت بوته، امکان دسترسی به فضای یکنواخت و هم‌سان برای بوته‌ها و اندازه یکنواخت بوته‌ها از جمله مهم‌ترین عوامل جهت دست‌یابی به عملکرد بالای شکر در واحد سطح محسوب می‌شود. بر همین پایه، از دو پارامتر تراکم بوته یا جمعیت بوته و ظهور گیاهچه‌ها در سطح مزرعه برای توصیف نحوه استقرار بوته‌ها استفاده می‌شود (Stibbe and Marlander, 2002).

کرکیج (Kerkij, 2001) با مقایسه چهار سطح تراکم بوته (۷۰، ۸۰، ۹۰ و ۱۰۰ هزار بوته در هکتار) در کشت پاییزه چغندر قند در استان سیستان و بلوچستان نشان داد که با افزایش تعداد بوته در واحد سطح، بر عملکرد ریشه، قند

ناخالص، قند خالص و عیار قند، درصد قند خالص و راندمان استحصال قند افزوده می‌شود. وی با استفاده از روابط ریاضی نشان داد که مناسب‌ترین تراکم بوته جهت کشت چغندر قند در منطقه سیستان و بلوچستان بین ۸۵ تا ۹۵ هزار بوته در هکتار متغیر است. حسین‌پور (Hosseinpour, 1996) با تغییر فواصل بین بوته‌ها روی ردیف‌های کاشت و ایجاد تراکم‌های ۵۵، ۸۲ و ۱۶۴ هزار بوته در هکتار نشان داد که بیش‌ترین درصد قند (۱۵/۷ درصد) و عملکرد ریشه (۹۶/۴ تن در هکتار) به ترتیب به تراکم‌های ۱۶۴ و ۵۵ هزار بوته در هکتار تعلق داشت. نامبرده در کشت پاییزه چغندر قند، تراکم مناسب را ۸۲ هزار بوته در هکتار گزارش کرد. در هندوستان، تراکم بوته توصیه‌شده برای کشت پاییزه چغندر قند معادل ۱۲۰ هزار بوته در هکتار است (Singh Brar et al., 2015). اسماعیل و عالم (Ismail and Allam, 2007) نیز نشان دادند که بیشترین عملکرد چغندر قند با تراکم ۷۰-۱۰۵ هزار بوته در هکتار قابل حصول است. مناسب‌ترین تراکم بوته برای کشت چغندر قند حدود یک‌صد هزار بوته در هکتار با الگوی کشت ۲۰×۵۰ سانتی‌متر توصیه شده است (Shukla and Awashti, 2013)؛ (Bhullar et al., 2010؛ Sadre et al., 2012). در کشت بهاره، مناسب‌ترین تراکم بوته برای منطقه مشهد معادل ۷۵ تا ۹۵ هزار بوته در هکتار (Bayat, 1998)، در منطقه فارس

۵۹ دقیقه عرض شمالی و ۵۱ درجه و ۶ دقیقه طول شرقی با ارتفاع ۱۳۰۰ متر از سطح دریا اجرا شد. در هر سال، پس از عملیات خاک‌ورزی و تسطیح و پیش از کاشت، نمونه خاک از دو عمق ۰-۳۰ و ۳۰-۶۰ سانتی‌متری برداشت و مشخصات شیمیایی و فیزیکی خاک تعیین شد. خاک منطقه، خیلی عمیق با بافت لوم رس سیلتی تا لوم رسی است و جزو خاک‌های رسوبی محسوب می‌شود.

پس از عملیات خاک‌ورزی و تسطیح، فاروها به فاصله ۵۰ سانتی‌متر ایجاد و سپس عملیات کاشت در تاریخ‌های ۲۵ و ۲۴ فروردین به ترتیب در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بر اساس نقشه کاشت انجام شد. در این مطالعه، از بذر منورم رقم دورتی (Doretta) استفاده شد. آزمایش به شکل فاکتوریل (۴×۶) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار پیاده و در مرحله ۶-۴ برگی بوته‌ها، کل کرت‌های آزمایشی تنک و تراکم بوته در حد ۱۲۵ هزاربوته در هکتار تنظیم شد (با فاصله بین بوته ۱۶ سانتی‌متر). فاکتورها یا عوامل مورد آزمایش عبارت بودند از فاکتور اول یا زمان کاشت بوته دارای چهار سطح شامل a_1 ۳۰، a_2 ۶۰، a_3 ۹۰ و a_4 ۱۲۰ روز از پس کاشت a_4 و شدت کاهش بوته شامل شش سطح عدم حذف بوته و حفظ تراکم اولیه حدود ۱۲/۵ بوته در مترمربع (b_1)، حذف ۲۵ درصد بوته‌ها و رساندن تراکم بوته به حدود ۹/۳۷۵ بوته در مترمربع (b_2)، حذف ۳۳ درصد

معادل ۹۰ تا ۱۱۰ هزار بوته در هکتار (Emadi, 2001)، ۱۶۶ هزار بوته در هکتار در منطقه چناران خراسان (Azizi, 1999)، ۸۰ هزار بوته در هکتار در منطقه خراسان (Ghaemi, 1993) و کرج (Habibi et al., 2004)، تعیین شده است.

از نظر تأثیر تغییرات تراکم بوته بر خصوصیات کیفی چغندر قند برخی از مطالعات حاکی از کاهش ناخالصی‌های ریشه (سدیم و پتاسیم) به دنبال افزایش تراکم بوته از ۶۰ به ۱۲۰ هزاربوته در هکتار است (Jafarnia et al., 2013). در مطالعه اخیر، بیشترین عملکرد شکر و کمترین ناخالصی‌های ریشه با تراکم ۹۰ هزاربوته در هکتار به دست آمد. در یک مطالعه دیگر، افزایش تراکم بوته از ۸۷/۵ به ۱۰۰ هزاربوته در هکتار، افزایش معنی‌دار در عیار قند، درجه خلوص، میزان قند قابل استحصال و عملکرد شکر را به دنبال داشت (Masri, 2008).

هدف از تحقیق حاضر تعیین زمان بحرانی در کاهش تراکم بوته در مزرعه چغندر قند و تأثیر تغییرات تراکم بوته در زمان‌های مختلف رشد روی عملکرد کمی و کیفی محصول چغندر قند در پایان فصل رشد بود.

مواد و روش‌ها

در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی مطهری (کمال‌آباد کرج) واقع در مختصات جغرافیایی ۳۵ درجه و

هر کرت از سه ردیف کاشت به طول هشت متر و با فاصله ۵۰ سانتی متر تشکیل شده بود. در انتهای فصل رشد، ریشه‌های موجود در ردیف دوم هر کرت پس از حذف بوته‌های واقع در نیم متر ابتدا و انتهای ردیف کاشت، برداشت و پس از کیسه‌گیری و تعیین وزن ناخالص برای اندازه‌گیری صفات کمی و کیفی محصول به آزمایشگاه تکنولوژی چغندر قند مؤسسه انتقال یافت. داده‌های حاصل پس از حصول اطمینان از تجانس واریانس‌ها (با استفاده از آزمون بارتلت) طی دو سال اجرای آزمایش با استفاده از نرم‌افزار MSTATC مورد تجزیه آماری قرار گرفت و مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد.

نتایج و بحث

مشخصات خاک مزرعه محل آزمایش در ایستگاه کمال آباد کرج در جدول ۱ نشان داده شده است.


بوته‌ها و رساندن تراکم بوته به حدود ۸/۳۷۵ بوته در مترمربع (b_3)، حذف ۵۰ درصد بوته‌ها و رساندن تراکم بوته به حدود ۶/۲۵ بوته در مترمربع (b_4)، حذف ۶۷ درصد بوته‌ها و رساندن تراکم بوته به حدود ۴/۱۲۵ بوته در مترمربع (b_5) و حذف ۷۵ درصد بوته‌ها و رساندن تراکم بوته به حدود ۳/۱۲۵ بوته در مترمربع (b_6). برای دستیابی به سطوح مورد مطالعه جمعیت گیاهی، بوته‌ها به شکل گزینشی روی خطوط کاشت حذف شدند. به همین منظور، پس از استقرار بوته‌ها (انجام عملیات تنک و وجین در کل قطعه آزمایشی)، تعداد و موقعیت بوته‌های مستقر روی هر یک از ردیف‌های کاشت مشخص و سپس با هدف حفظ تعداد بوته مورد نظر در هر تیمار، اقدام به انجام عملیات تنک بر اساس نقشه کاشت در سطح هر یک از کرت‌های آزمایشی شد. به طور میانگین فاصله بین بوته‌ها روی ردیف کاشت در سطوح مورد مطالعه شدت حذف بوته به ترتیب ۱۶، ۲۱، ۲۴، ۳۲، ۴۹ و ۶۴ سانتی متر بود.

جدول ۱- نتایج تجزیه خاک محل اجرای آزمایش
Table 1. Results of experiment location soil analysis

سال	عمق خاک	نیترژن کل	فسفر	پتاسیم	سدیم	واکنش خاک	هدایت الکتریکی
Year	Soil Depth (cm)	Total Nitrogen (%)	Phosphorus (ppm)	Potassium (ppm)	Na (ppm)	pH	EC ($ds.m^{-1}$)
2011	0-30	0.25	26.81	277.48	1.56	7.85	1.20
	30-60	0.15	19.78	218.41	1.36	7.90	0.95
2012	0-30	0.17	35.41	686.11	2.76	8.24	1.59
	30-60	-	14.24	358.57	2.78	8.36	1.29

به‌واسطه افزایش تراکم بوته، بین زمان تنک تا برداشت نهایی محصول از بین می‌رود (Smith, 1979; Cattanaach, 1979). در برخی منابع، به برداشت تنها ۷۰ درصد از گیاهچه‌های استقرار یافته چغندر قند در پایان فصل رشد اشاره شده است (Rengitnig, 1989).

در مطالعه کنونی طی بالاترین سطح تراکم بوته، حدود ۲۰ درصد از گیاهچه‌های استقرار یافته در زمان برداشت از بین رفتند اما در سطوح پایین‌تر تراکم، چنین شرایطی حاکم نبود (شکل ۱). گزارش‌های موجود نیز حاکی از افزایش تعداد بوته‌هایی است که



شکل ۱- مقایسه سطوح تراکم بوته اعمال شده با تراکم نهایی در زمان برداشت در سطوح مختلف شدت حذف بوته

Fig. 1. Comparison of target sugar beet plant population and final plant populations at harvest date in different reduction rates
b1: 12.5 plantm⁻²; b2: 9.375 plantm⁻²; b3: 8.375 plantm⁻²; b4: 6.25 plantm⁻²; b5: 4.125 plantm⁻²; b6: 3.125 plantm⁻².

۱۳۹۱ (به‌ترتیب معادل ۹۹/۴۶، ۱۳/۹۷ و ۹/۱۰ تن در هکتار) شد (جدول ۳). عامل سال در سطح احتمال یک درصد بر عملکرد ریشه و شکر خام و در سطح احتمال پنج درصد بر عملکرد شکر سفید در هر بوته نیز تأثیر معنی‌داری گذاشت (جدول ۲). این تأثیر

اثر سال بر عملکرد ریشه، شکر خام و شکر سفید تولید شده در واحد سطح در سطح احتمال یک درصد معنی‌داری بود (جدول ۲). عملکرد ریشه، شکر خام و شکر سفید در سال ۱۳۹۰ (به‌ترتیب معادل ۶۸/۳۵، ۸/۷۶ و ۷/۱۱ تن در هکتار) به‌نحو معنی‌داری کمتر از سال

جدول ۲- تجزیه واریانس عملکرد ریشه، شکر خام و شکر سفید چغندر قند رقم دورتی تحت تاثیر زمان و میزان کاهش تعداد بوته
 Table 2. Analysis of variance of sugar beet root, crude sugar and white sugar yield of sugar beet cultivar Doretta as affected by plant population reduction time and rate

S.O.V.	منابع تغییرات	درجه آزادی df.	میانگین مربعات MS					
			عملکرد ریشه Root yield		عملکرد شکر Sugar yield		عملکرد شکر سفید White sugar yield	
			در واحد سطح Per unit area	در بوته Per plant	در واحد سطح Per unit area	در بوته Per plant	در واحد سطح Per unit area	در بوته Per plant
Year (Y)	سال	1	46465.99**	8.947**	1302.59**	0.271**	189.20**	0.031*
Rep (Y)	تکرار (سال)	6	205.98	0.102	8.61	0.003	10.41	0.003
Plant reduction time (A)	زمان کاهش بوته	3	2843.78 ^{ns}	1.456*	52.81 ^{ns}	0.027*	26.63 ^{ns}	0.013*
Y × A	سال × زمان کاهش بوته	3	334.69 ^{ns}	0.093 ^{ns}	9.32 ^{ns}	0.002 ^{ns}	5.88 ^{ns}	0.001 ^{ns}
Plant reduction rate (B)	میزان کاهش بوته	5	3978.56**	4.631**	63.75**	0.091*	34.96**	0.046**
Y × B	سال × میزان کاهش بوته	5	238.11 ^{ns}	0.343*	3.74 ^{ns}	0.009*	2.52 ^{ns}	0.002 ^{ns}
A × B	زمان × میزان کاهش بوته	15	282.27 ^{ns}	0.424**	5.81 ^{ns}	0.008**	3.77 ^{ns}	0.004 ^{ns}
Y × A × B	سال × زمان × میزان کاهش بوته	15	262.35 ^{ns}	0.113 ^{ns}	6.07 ^{ns}	0.002*	4.89 ^{ns}	0.001 ^{ns}
Error	خطا	138	230.99	0.071	4.71	0.001	2.75	0.001
CV.(%)	درصد ضریب تغییرات		18.11	19.59	19.10	19.69	20.45	22.14

ns،* و **: به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد.

ns, * and **: Not significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

جدول ۳- مقایسه میانگین عملکرد ریشه، شکر خام و شکر سفید چغندر قند رقم دورتی در سطوح مختلف زمان و میزان کاهش تعداد بوته

Table 3. Mean comparison of sugar beet root, crude sugar and white sugar yield of sugar beet cultivar Doretta in different treatments of plant population reduction time and rate

Treatments	تیمارها	عملکرد ریشه Root yield		عملکرد شکر Sugar yield		عملکرد شکر سفید White sugar yield	
		تن در هکتار tha ⁻¹	کیلوگرم در بوته kgplant ⁻¹	تن در هکتار tha ⁻¹	کیلوگرم در بوته kgplant ⁻¹	تن در هکتار tha ⁻¹	کیلوگرم در بوته kgplant ⁻¹
Year	سال						
2011	۱۳۹۰	68.35b	1.144b	8.76b	0.147b	7.11b	0.119b
2012	۱۳۹۱	99.46a	1.576a	13.97a	0.222a	9.10a	0.144a
Plant reduction time	زمان کاهش بوته						
30 days after sowing	۳۰ روز پس از کاشت	93.59a	1.529a	12.63a	0.206a	8.97a	0.147a
60 days after sowing	۶۰ روز پس از کاشت	85.63a	1.485a	11.62a	0.201a	8.30a	0.144ab
90 days after sowing	۹۰ روز پس از کاشت	81.01a	1.258b	11.07a	0.172b	7.98a	0.125bc
120 days after sowing	۱۲۰ روز پس از کاشت	75.38a	1.169b	10.12a	0.157b	7.17a	0.111c
Plant reduction rate	میزان کاهش بوته						
12.5 plantsm ⁻²	۱۲/۵ بوته در مترمربع	95.54a	0.994b	12.97a	0.133c	9.43a	0.095c
9.375 plantsm ⁻²	۹/۳۷۵ بوته در مترمربع	91.47ab	1.051b	12.18ab	0.140c	8.68ab	0.101bc
8.375 plantsm ⁻²	۸/۳۷۵ بوته در مترمربع	89.81ab	1.155b	12.06ab	0.156c	8.55ab	0.113bc
6.25 plantsm ⁻²	۶/۲۵ بوته در مترمربع	84.00bc	1.310b	11.38bc	0.177bc	8.07bc	0.125b
4.125 plantsm ⁻²	۴/۱۲۵ بوته در مترمربع	77.48c	1.735a	10.59c	0.236ab	7.45cd	0.167a
3.125 plantsm ⁻²	۳/۱۲۵ بوته در مترمربع	65.12d	1.915a	8.99d	0.263a	6.45d	0.189a

میانگین‌های دارای حروف مشترک در هر ستون اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

Means within each column followed by similar letters are not significantly different at 5% of probability level.

به نحوی بود که هر بوته در سال ۱۳۹۱ عملکرد ریشه (۱/۵۷۶ کیلوگرم)، شکر خام (۰/۲۲۲ کیلوگرم) و شکر سفید (۰/۱۴۴ کیلوگرم) بیشتری نسبت به سال ۱۳۹۰ (به ترتیب معادل ۱/۱۴۴، ۰/۱۴۷ و ۰/۱۱۹ کیلوگرم در بوته) تولید کرد (جدول ۳). این موضوع می‌تواند به دلیل شرایط آب‌وهوایی حاکم در سال‌های مختلف آزمایش باشد.

زمان کاهش بوته تأثیر معنی‌داری بر عملکرد محصول در واحد سطح نگذاشت. این بدان مفهوم است که زمان کاهش تعداد بوته یا وقوع خسارت‌های قه‌ری که منجر به کاهش تعداد بوته در واحد سطح می‌شوند طی ۱۲۰-۳۰ روز پس از کاشت تأثیر معنی‌داری بر عملکرد نهایی محصول در واحد سطح نداشت. این در حالی بود که این عامل بر عملکرد ریشه، شکر خام و شکر سفید تولید شده در بوته در سطح احتمال پنج درصد معنی‌دار شد. نتایج مقایسه میانگین‌ها نشان داد که با کاهش تعداد بوته طی ۶۰-۳۰ روز پس از کاشت، بیشترین عملکرد ریشه (۱/۴۸۵-۱/۵۲۹ کیلوگرم در بوته)، شکر خام (۰/۲۰۶-۰/۲۰۱ کیلوگرم در بوته) و شکر سفید (۰/۱۴۴-۰/۱۴۴ کیلوگرم در بوته) تولید شد و در صورت به تأخیر افتادن زمان کاهش تعداد بوته به بیش از ۶۰ روز پس از کاشت، کاهش معنی‌داری در عملکرد ریشه و شکر خام در بوته (به ترتیب معادل ۱۵/۳ و ۱۴/۴ درصد) روی خواهد داد.

حساسیت عملکرد شکر سفید در بوته نسبت

به تغییرات زمان کاهش بوته در مقایسه با عملکرد ریشه و شکر خام بیشتر بود و با وقوع عوامل قه‌ری یا مدیریتی منجر به کاهش بوته طی ۶۰ روز پس از کاشت، از خود واکنش معنی‌داری نشان داد. هم‌چنان که در جدول (۳) مشاهده می‌شود، عملکرد شکر سفید در صورت کاهش تعداد بوته طی ۳۰ روز پس از کاشت در بالاترین سطح (۱۴۷ گرم در بوته) بود و با کاهش تراکم طی ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ روز پس از کاشت، به ترتیب معادل ۳، ۲۵ و ۳۶ گرم در بوته از آن کاسته شد. غیرمعنی‌دار شدن اثر متقابل سال × زمان کاهش بوته نشان داد که طی دو سال اجرای آزمایش، نحوه تأثیر زمان کاهش بوته بر عملکرد محصول (در واحد سطح و بوته) ثابت باقی ماند.

شدت حذف بوته‌ها و تراکم ایجاد شده در سطح احتمال یک درصد تأثیر معنی‌داری بر عملکرد محصول در واحد سطح داشت (جدول ۲). بیشترین عملکرد ریشه (۸۹/۸۱-۹۵/۵۴ تن در هکتار)، شکر خام (۱۲/۹۷-۱۲/۰۶ تن در هکتار) و شکر سفید (۸/۵۵-۹/۴۳ تن در هکتار) طی سطوح تراکم ۱۲/۵-۸/۳۷۵ بوته در مترمربع (با تراکم نهایی واقعی ۱۰/۲-۷/۷ بوته در مترمربع) به دست آمد. عملکرد محصول در تراکم ۶/۲۵ بوته در مترمربع (به ترتیب ۸۴/۰۰، ۱۱/۳۸ و ۸/۰۷ تن در هکتار)، اختلاف معنی‌داری با سطوح تراکم ۹/۳۷۵ و ۸/۳۷۵ بوته در مترمربع نداشت اما کاهش معنی‌داری نسبت به تراکم ۱۲/۵ بوته در مترمربع نشان داد. کاهش

ریشه افزود و با فرض خطی بودن این تأثیر، به ازای هر یک هزار بوته افزایش در هکتار، حدود ۰/۷ درصد (۵۹۷/۸ کیلوگرم در هکتار) بر عملکرد ریشه افزوده شد (Sadeghzadeh Hemayati, 2008). گزارش‌های متعددی حاکی از افزایش عملکرد ریشه به‌همراه افزایش تراکم بوته هستند (Sogut and Aroglu, 2004). محدوده مناسب تراکم بوته جهت دستیابی به بیش‌ترین عملکرد ریشه در این گزارش‌ها حدود ۷۵ هزاربوته در هکتار (Scott and Jaggard, 1993)؛ ۷۰ تا ۱۱۰ هزاربوته در هکتار (Lauer, 1995)؛ ۸۰ هزار بوته در هکتار (Ghaemi, 1993)؛ ۷۳ تا ۸۹ هزاربوته در هکتار (Smith, 1979)؛ ۸۲ هزاربوته در هکتار (Hosseinpour, 1996)؛ ۷۵ تا ۹۵ هزاربوته در هکتار (Bayat, 1998)؛ ۸۸/۲ هزاربوته در هکتار (Cattanach, 1993)؛ ۸۵ تا ۹۵ هزاربوته در هکتار (Kerkij, 2001)؛ ۹۰ تا ۱۱۰ هزاربوته در هکتار (Emadi, 2001) متغیر بود. نتایج برخی تحقیقات نیز نشان داده است که عملکرد ریشه در محدوده نسبتاً وسیعی از تراکم بوته (بین ۵۰ تا ۹۰ هزار بوته در هکتار)، تقریباً ثابت باقی می‌ماند. این نکته بیانگر آن است که چغندر قند می‌تواند به‌طور مؤثری تغییر تراکم را از طریق کاهش یا افزایش وزن تک ریشه جبران کند (Khodadadian, 1992). در مطالعه بیات و همکاران (Bayat et al., 2001) نیز عملکرد ریشه در محدود تراکم‌های ۵۵ تا ۱۱۵ هزاربوته

تراکم بوته به ۴/۱۲۵ و ۳/۱۲۵ بوته در مترمربع نیز کاهش عملکرد محصول را به‌دنبال داشت. تأثیر تراکم بوته بر عملکرد ریشه و شکر سفید در بوته نیز در سطح احتمال یک درصد و عملکرد شکر خام در بوته در سطح احتمال پنج درصد معنی‌دار شد (جدول ۲). هم‌چنان‌که در جدول ۳ دیده می‌شود، بیش‌ترین عملکرد ریشه (۱/۷۳۵-۱/۹۱۵ کیلوگرم در بوته)، شکر خام (۰/۲۳۶-۰/۲۶۳ کیلوگرم در بوته) و شکر سفید (۰/۱۶۷-۰/۱۸۹ کیلوگرم در بوته) برای سطوح تراکم ۳/۱۲۵-۴/۱۲۵ بوته در مترمربع به‌دست آمد و با افزایش تراکم بوته از عملکرد محصول در بوته به‌نحو معنی‌داری کاسته شد. البته، عملکرد ریشه در بوته طی سطوح ۱۲/۵-۶/۲۵ بوته در مترمربع (۰/۹۹۴-۱/۳۱۰ کیلوگرم در بوته) و عملکرد شکر خام و شکر سفید طی سطوح تراکم ۸/۳۷۵-۱۲/۵ بوته در مترمربع (به‌ترتیب معادل ۰/۱۵۶-۰/۱۳۳ و ۰/۱۱۳-۰/۰۹۵ کیلوگرم در بوته) در سطح آماری مشابهی بودند (جدول ۳). با افزایش شدت حذف بوته‌ها و به‌دنبال آن کاهش جمعیت گیاهی در واحد سطح، بر عملکرد محصول در بوته افزوده شد و از عملکرد در واحد سطح کاسته شد. بیش‌ترین عملکرد محصول در بوته و واحد سطح به‌ترتیب برای تراکم ۳/۱۲۵-۴/۱۲۵ و ۸/۳۷۵-۱۲/۵ بوته در مترمربع به‌دست آمد. افزایش تراکم بوته از ۶۵ به ۱۰۵ هزار بوته در هکتار، به‌میزان ۲۷/۴ درصد (۲۳/۹۱ تن در هکتار) بر عملکرد

در هکتار اختلاف معنی داری نداشت و تقریباً ثابت بود. همچنین در کشت پاییزه چغندر قند، با وجود آنکه میزان رشد و عملکرد ریشه در تراکم ۱۰۰ هزار بوته بیش از تراکم ۸۰ هزار بوته در هکتار بود، ولی این اختلاف به نظر آماری معنی دار نبود (Garcia and Lope, 1986).

اثر متقابل سال × میزان حذف بوته و زمان × میزان کاهش بوته روی عملکرد محصول در واحد سطح تأثیر معنی داری نگذاشت، بنابراین این امکان که بتوان اثر زمان کاهش بوته بر عملکرد محصول را از طریق تغییر در شدت کاهش یا برعکس جبران کرد، وجود ندارد. این در حالی بود که اثر متقابل سال × میزان کاهش بوته در سطح احتمال پنج درصد بر عملکرد ریشه و شکر خام در بوته و اثر متقابل زمان × میزان کاهش بوته در سطح احتمال یک درصد بر عملکرد ریشه، شکر خام در بوته تأثیر معنی داری گذاشت (جدول ۲).

به استثنای سدیم، اثر سال بر سایر صفات کیفی مورد اندازه گیری معنی دار شد (جدول ۴). درصد قند ناخالص در سال ۱۳۹۱ (۱۴/۰۶ درصد) بیش از سال ۱۳۹۰ (۱۲/۸۲ درصد) اما درصد قند خالص در سال ۱۳۹۱ (۹/۱۶ درصد) به واسطه بالا بودن میزان قند ملاس (۴/۳۰ درصد) به نحو غیر معنی داری کمتر از سال ۱۳۹۰ (۱۰/۴۱ درصد) شد (جدول ۵). میزان پتاسیم و نیتروژن مضره در سال ۱۳۹۰ (به ترتیب ۵/۲۰ و ۰/۶۲ میلی اکی والان در صد گرم خمیر ریشه) به نحو

معنی داری کمتر از سال ۱۳۹۱ (به ترتیب معادل ۷/۱۷ و ۴/۱۸ میلی اکی والان در صد گرم خمیر ریشه) بود (جدول ۵). هم چنان که در خصوص عملکرد محصول نیز دیده شد، شرایط آب و هوایی حاکم در سال ۱۳۹۱، علاوه بر خصوصیات کمی موجب بهبود خصوصیات کیفی محصول نیز شده است.

اثر زمان کاهش بوته بر صفات کیفی محصول معنی دار نشد. تنها اثر متقابل سال × زمان حذف بوته در سطح احتمال پنج درصد روی ضریب قلیائیت ریشه تأثیر معنی داری گذاشت. این تأثیر به نحوی بود که در سال ۱۳۹۰، ضریب قلیائیت ریشه طی کاهش بوته در ۹۰ روز پس از کاشت بیش از سایر زمان های کاهش بوته شد اما در سال ۱۳۹۱، اختلاف معنی داری بین زمان های مختلف کاهش بوته دیده نشد (جدول ۵).

تأثیر تراکم بوته بر درصد قند ناخالص و خالص معنی دار نشد. این در حالی است که افزایش درصد قند با کوچک تر شدن اندازه ی ریشه ها در گزارش های متعددی مورد تأکید قرار گرفته است (Cakmakci and Oral, 2002؛ Lauer, 1995؛ Minx, 1993). دلیل افزایش درصد قند با افزایش تراکم بوته به کاهش اندازه ریشه و از آنجا، مجاورت بخش عمده ای از سلول های ریشه در جوار سیستم آوندی نسبت داده شده است (Wyse, 1979) البته، عدم تأثیر معنی دار تراکم بوته بر درصد قند نیز در

جدول ۴- تجزیه واریانس خصوصیات کیفی چغندر قند رقم دورتی تحت تاثیر زمان و میزان کاهش تعداد بوته
 Table 4. Analysis of variance of qualitative characteristics of sugar beet cultivar Doretta as affected by plant population reduction time and tate

S.O.V.	منابع تغییرات	درجه آزادی df.	میانگین مربعات MS							
			درصد قند ناخالص Sugar content	درصد قند خالص White sugar content	سدیم Na	پتاسیم Potassium	نیترژن مضره Amino nitrogen	ضریب قلیابیت Alkalinity coefficient	ضریب استحصال شکر Extraction coefficient of sugar	قند ملاس Molasses sugar
Year (Y)	سال	1	73.76**	75.20*	13.24 ^{ns}	186.13**	607.44**	10183.56**	12669.31**	297.98**
Rep (Y)	تکرار (سال)	6	3.27	7.22	4.82	4.67	5.70	62.51	123.89	1.76
Plant reduction time (A)	زمان کاهش بوته	3	0.25 ^{ns}	0.95 ^{ns}	1.24 ^{ns}	0.10 ^{ns}	0.80 ^{ns}	41.92 ^{ns}	21.48 ^{ns}	0.25 ^{ns}
Y × A	سال × زمان کاهش بوته	3	0.19 ^{ns}	0.48 ^{ns}	2.72 ^{ns}	0.16 ^{ns}	0.35 ^{ns}	43.94*	13.78 ^{ns}	0.17 ^{ns}
Plant reduction rate (B)	میزان کاهش بوته	5	0.91 ^{ns}	0.89 ^{ns}	0.77 ^{ns}	2.64**	0.11 ^{ns}	11.56 ^{ns}	10.84 ^{ns}	0.18 ^{ns}
Y × B	سال × میزان کاهش بوته	5	0.57 ^{ns}	0.51 ^{ns}	0.89 ^{ns}	0.20 ^{ns}	0.11 ^{ns}	14.75 ^{ns}	8.99 ^{ns}	0.13 ^{ns}
A × B	زمان × میزان کاهش بوته	15	0.69 ^{ns}	1.25 ^{ns}	1.03 ^{ns}	0.26 ^{ns}	0.21 ^{ns}	10.97 ^{ns}	19.67 ^{ns}	0.19 ^{ns}
Y × A × B	سال × زمان × میزان کاهش بوته	15	0.61 ^{ns}	1.20 ^{ns}	1.19 ^{ns}	0.38 ^{ns}	0.23 ^{ns}	9.21 ^{ns}	21.06 ^{ns}	0.22 ^{ns}
Error	خطا	138	0.62	0.97	0.98	0.24	0.15	12.11	13.22	0.11
CV.(%)	درصد ضریب تغییرات	-	5.86	10.09	20.39	7.89	16.25	23.74	4.98	10.80

ns,*,** و **: به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد.

ns,*,** and **: Not significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

جدول ۵- مقایسه میانگین خصوصیات کیفی چغندر قند رقم دورتی در سطوح مختلف زمان و میزان کاهش تعداد بوته
 Table 5. Mean comparison of qualitative characteristics of sugar beet cultivar Doretti in different treatments of plant population reduction time and rate

Treatments	تیماها	درصد قند ناخالص Sugar content (%)	درصد قند خالص White sugar content (%)	سدیم Na ₁ (meq.100 ⁻¹ g root)	پتاسیم Potassium (meq.100 ⁻¹ g root)	نیتروژن مضره Amino nitrogen	ضریب قلیائیت Alkalinity coefficient	ضریب استحصال شکر Extraction coefficient of sugar (%)	قند ملاس Molasses Sugar (%)
Year	سال								
2011	۱۳۹۰	12.82b	10.41a	4.59a	5.20b	0.62b	17.59a	81.14a	1.81a
2012	۱۳۹۱	14.06a	9.16a	5.11a	7.17a	4.18a	3.03b	64.89b	4.30a
Plant reduction time	زمان کاهش بوته								
30 days after sowing	۳۰ روز پس از کاشت	13.39a	9.69a	4.59a	6.24a	2.53a	10.01a	72.63a	3.10a
60 days after sowing	۶۰ روز پس از کاشت	13.49a	9.84a	4.79a	6.16a	2.49a	9.49a	73.16a	3.05a
90 days after sowing	۹۰ روز پس از کاشت	13.51a	9.96a	4.66a	6.14a	2.30a	11.66a	73.89a	2.59a
120 days after sowing	۱۲۰ روز پس از کاشت	13.36a	9.66a	5.01a	6.20a	2.29a	10.10a	72.37a	3.11a
Plant reduction rate	میزان کاهش بوته								
12.5 plantsm ⁻²	۱۲/۵ بوته در مترمربع	13.50a	9.95a	4.89a	5.87a	2.37a	10.81a	73.89a	2.95a
9.375 plantsm ⁻²	۹/۳۷۵ بوته در مترمربع	13.16a	9.57a	4.88a	5.86c	2.43a	9.43a	72.82a	2.99a
8.375 plantsm ⁻²	۸/۳۷۵ بوته در مترمربع	13.30a	9.63a	4.97a	6.17b	2.49a	10.85a	72.60a	3.07a
6.25 plantsm ⁻²	۶/۲۵ بوته در مترمربع	13.51a	9.80a	4.92a	6.20b	2.44a	9.89a	72.68a	3.11a
4.125 plantsm ⁻²	۴/۱۲۵ بوته در مترمربع	13.53a	9.78a	4.90a	6.49a	2.37a	10.07a	72.49a	3.16a
3.125 plantsm ⁻²	۳/۱۲۵ بوته در مترمربع	13.61a	9.99a	4.54a	6.53a	2.32a	10.81a	73.59a	3.02a

میانگین های دارای حروف مشترک در هر ستون اختلاف معنی داری در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

Means within each column followed by similar letters are not significantly different at 5% of probability level.

Minx, 1993؛ Lauer, 1995؛
 Smith et al., 1977) به کاهش شدت رقابت
 بین بوته‌ها در سطوح پایین تراکم بوته نسبت
 داده شده‌است (Echoff et al., 1991). از همین
 رو، کاشت چغندر قند در تراکم‌های بالای بوته
 از طریق محدود کردن توسعه سلولی موجب
 کاهش اندازه ریشه و از آنجا، کاهش
 میزان ناخالصی‌های محتوی آن می‌شود
 (Ghaemi, 1993).

در مجموع، مطالعه حاضر نشان داد که زمان
 کاشت بوته (ناشی از عوامل قهری و مدیریتی)
 در بازه زمانی ۱۲۰-۳۰ روز پس از کاشت،
 عمدتاً روی محصول تولیدشده در هر بوته اثر
 معنی‌داری به‌جا گذاشت و بیشترین عملکرد
 ریشه، شکر خام و شکر سفید با کاهش تعداد
 بوته طی ۶۰-۳۰ روز پس از کاشت - و نه پس
 از آن - حاصل شد. این در حالی بود که کاهش
 تعداد بوته (در محدوده ۱۰/۲-۳/۴ بوته در
 مترمربع) طی ۱۲۰-۳۰ روز پس از کاشت، تأثیر
 معنی‌داری بر عملکرد نهایی محصول در واحد
 سطح نداشت. علاوه بر این، زمان کاشت بوته
 در محدوده ۱۰/۲-۳/۴ بوته در مترمربع، تأثیر
 معنی‌داری بر خصوصیات کیفی محصول
 نداشت. با افزایش شدت کاهش بوته و به‌دنبال
 آن کاهش جمعیت گیاهی در واحد سطح، بر
 عملکرد محصول در بوته افزوده شد و از
 عملکرد در واحد سطح کاسته شد. در نهایت،
 بیشترین عملکرد محصول در واحد سطح
 (۸۹/۸۱-۹۵/۵۴ تُن ریشه در هکتار و

برخی گزارش‌ها به چشم می‌خورد
 (Sadeghzadeh Hemayati, 2008)
 شدت حذف (Cattanach, 1979 and 1993)
 بوته‌ها در سطح احتمال یک درصد تنها بر میزان
 پتاسیم محتوی ریشه تأثیر معنی‌داری داشت
 (جدول ۴). این تأثیر به‌نحوی بود که با افزایش
 تعداد بوته در واحد سطح، از مقدار پتاسیم ریشه
 کاسته شد (جدول ۵). بنابراین، بیشترین میزان
 پتاسیم (۶/۵۳-۶/۴۹ میلی‌اکی‌والان در صد گرم
 خمیر ریشه) در تراکم‌های ۴/۱۲۵-۳/۱۲۵ بوته
 در مترمربع و کمترین مقدار (۵/۸۷-۵/۸۶ میلی‌اکی‌والان در صد گرم
 خمیر ریشه) در تراکم‌های ۱۲/۵-۹/۳۷۵ بوته در
 مترمربع به‌دست آمد. در مطالعه دیگر صادق‌زاده
 حمایتی (۲۰۰۸) نیز سطوح مورد آزمایش تراکم
 بوته (۱۰/۵-۶ بوته در مترمربع) روی میزان
 پتاسیم محتوی ریشه تأثیر معنی‌داری داشت و با
 افزایش تعداد بوته از مقدار پتاسیم ریشه کاسته
 شد. نتایج متناقضی در خصوص تأثیر تغییرات
 تراکم بوته بر مقادیر سدیم، پتاسیم و نیتروژن
 مضره محتوی ریشه چغندر قند وجود دارد. در
 شرایطی که برخی پژوهشگران به تأثیر تراکم
 بوته روی املاح معدنی موجود در ریشه اشاره
 می‌کنند (Azizi, 1999)، پژوهشگران دیگر
 عدم تأثیر معنی‌دار تراکم بوته را روی
 ناخالصی‌های ریشه مورد تأکید قرار می‌دهند
 (Emadi, 2001). در مجموع، وجود همبستگی
 منفی بین تراکم بوته و املاح معدنی موجود در
 ریشه (Smith and Martin, 1997)؛

وقوع عوامل مدیریتی یا قهری که به کاهش تعداد بوته در واحد سطح منجر می‌شوند، صرف نظر از زمان وقوع خسارت تا حدود دوسوم ابتدای فصل رشد، عامل تعیین کننده در کاهش معنی دار عملکرد شدت کاهش تعداد بوته‌هاست.

۱۲/۹۷-۱۲/۰۶ تُن شکر خام در هکتار) در تراکم قابل برداشت ۱۰/۲-۷/۷ بوته در مترمربع حاصل شد. در واقع، بوته‌های چغندر قند طی این دامنه از تغییرات تراکم بوته توانستند نوسانات تعداد بوته در واحد سطح را از طریق تغییر در عملکرد بوته جبران کنند. بنابراین، در صورت

References

- Azizi, G. 1999.** The effects of planting date, density and harvest date on some agronomical and physiological characteristics of sugar beet in Chenaran. MSc. Thesis, University of Sistan and Baluchestan, Zabol, Iran. 106 pp. (in Persian).
- Ball, R. A., Purcell, L. C., and Vories, E. D. 2000.** Optimizing soybean plant population for a short-season production system in the southern USA. *Crop Science* 40: 757-764.
- Bayat, A. 1998.** Evaluation of plant density and harvest date on quantitative and qualitative characteristics of three monogerm sugar beet. MSc. Thesis, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran (in Persian).
- Bayat, A., Latifi, N., Mohammadian, R., and Galeshi, S. 2001.** Evaluation of plant density effect on technological maturity of three sugar beet cultivars. *Iranian Journal of Agriculture Sciences* 32(2): 275-284.
- Bhullar, M. S., Uppal, S. K., and Kapur, M. L. 2010.** Influence of planting density and nitrogen dose on root and sugar yield of beet (*Beta vulgaris* L.) under sub-tropical semi-arid conditions of Punjab. *Journal Research of Punjab Agricultural University* 47: 7-14.
- Board, J. 2000.** Light interception efficiency and light quality affect yield compensation of soybean at low plant populations. *Crop Science* 40: 1285-1294.
- Cakmakci, R., and Oral, E. 2002.** Root yield and quality of sugar beet in relation to sowing date, plant population and harvesting date interactions. *Turkish Journal of Agriculture and Forestry* 26: 133-139.
- Cattanach, A. W. 1979.** Comparison of 22 vs. 30 inch row spacings at equal plant

- populations. Sugar Beet Research and Extension Reports 10: 198-203.
- Cattanach, A. W. 1993.** Effect of greater than recommended plant populations on sugarbeet yield and quality. Sugar Beet Research and Extension Reports 24: 314-319.
- Clover, G. R. G., Jaggard, K. W., Smith, H. G., and Azam, S. N. 2001.** The use of radiation interception and transpiration to predict the yield of healthy, droughted and virus-infected sugar beet. Journal of Agricultural Science 136(2): 169-178.
- Echoff, J. L. A., Halverson, A. D., Weiss, M. J., and Borbaman, J. W. 1991.** Seed spacing for nonthined sugar beet production. Agronomy Journal 83: 929-932.
- Emadi, A. 2001.** Effects of plant density and nitrogen levels on sugar beet in Koshkak region in Fars province. MSc. Thesis, Shiraz University, Shiraz, Iran (in Persian).
- Garcia, J. E., and Lopez Bellido, L. 1986.** Growth and yield of autumn-sown sugar beet: Effects of sowing time, plant density and cultivar. Field Crops Research 14: 1-14.
- Ghaemi, A. 1993.** Effects of plant density on quantitative and qualitative characteristics and anatomy of four sugar beet cultivars. MSc. Thesis, Mashhad University, Mashhad, Iran (in Persian).
- Habibi, D., Nourmohammadi, G., Karimi Abadchi, M. M., Majidi Heravan, A., and Darvish, F. 2004.** Effects of planting date and plant density on root yield and sugar content of sugar beet. Iranian Journal of Agriculture Sciences 10 (1): 22-33 (in Persian).
- Hodanova, D. 1975.** Chlorophyll, leaf area-dry weight indices and PhAR attenuation in developing sugar beet canopy. Photosynthetica 9(2): 211-215.
- Hole, C. C., Thomas, T. H., and McKee, J. M. T. 1984.** Sink development and dry matter distribution in storage root crops. Plant Growth Regulation 2(4): 347-358.
- Hosseinpour, M. 1996.** Effects of nitrogen, potassium and plant density interaction on quantitative and qualitative yield of sugar beet in Dezfoul region. MSc. Thesis, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran (in Persian).
- Ismail, A. M. A., and Allam, S. M. 2007.** Yield and technological traits of sugar beet as affected by planting density, phosphorus and potassium fertilization. Proceedings of the 3rd Conference of Sustainable Agricultural Development. Faculty of Agriculture, Fayoum University, Pakistan. pp. 15-28.

- Jafarnia, B., Ghorbani, R., Zare Feizabady, A., and Ghaemi, A.R. 2013.** Impact of crop density and soil fertilization on sugar beet. *International Journal of Crop Science* 5(24): 2991-2999.
- Kenter, C., Hoffmann, C. M., and Märlander, B. 2006.** Effects of weather variables on sugar beet yield development (*Beta vulgaris* L.). *European Journal of Agronomy* 24(1): 62-69.
- Kerkij, P. 2001.** The effects of plant density on quantitative and qualitative characteristics of autumn-planting sugar beet in Sistan. MSc. Thesis, University of Sistan and Baluchestan, Zabol, Iran (in Persian).
- Khodadadian, J. 1992.** Advances in Production of Sugar Beet. Iran's Sugar Factories Syndicate Press, Tehran, Iran (in Persian).
- Lauer, J. G. 1995.** Plant density and nitrogen rate effects on sugar beet yield and quality early in harvest. *Agronomy Journal* 87: 586-591.
- Masri, M. I. 2008.** Effect of nitrogen level and planting density on sugar beet yield and its attributes. *Egypt Journal of Agronomy* 30: 119-36.
- Minx, L. 1993.** The effect of row spacing on the productive utilization of distances between plants by the sugar beet stand. *Rostlinna Vyroba* 39(6): 531-541.
- Ohtake, M., Saito, H., and Kanzawa, K. 1997.** Relation between root dry matter production and cumulative solar radiation. *Proceedings of Japanese Society of Sugar Beet Technologists* 39: 108-114.
- Reigtig, P. J. 1989.** Effect of plant-to stand spacing on sugarbeet production. *Beet Research and Extension Reports* 20: 157-162.
- Sadeghzadeh Hemayati, S. 2008.** Effects of some agronomical factors on light absorbption, growth and yield of sugar beet. Ph. D. Thesis, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran (in Persian).
- Sadre, P., Soleymani, A., and Javanmard, H. R. 2012.** Root yield and quality traits of sugar beet (*Beta vulgaris* L.) in relation to nitrogen fertilizer and plant density in isfahan region. *International Journal of Crop Science* 4: 1504-07.
- Schiphouwer, T. 1991.** Cultivar, soil and climate fix the yield. *Maandbla Suiker Unie* 25(9): 9-10.
- Scott, R. K., and Jaggard, K. W. 1978a.** How the crop grows-from seed to sugar. *British Sugar Beet Review* 46(4): 19-22.

- Scott, R. K., and Jaggard, K. W. 1978b.** Theoretical criteria for maximum yield. pp. 179-198. In: Proceedings of the 41st Winter Congress. Institut Int. de Recherches, Betteravieres, France.
- Scott, R. K., and Jaggard, K. W. 1992.** Crop growth and weather: can yield forecasts be reliable? 55e Congres d'hiver, Bruxelles, Palais des Congres, pp. 169-187.
- Scott, R.K. , and Jaggard, K. W. 1993.** Crop physiology. pp. 279-309. In: Cooke, D. A., and Scott, R. K. (ed.) The Sugar Beet Crop: Science into Practice. Chapman and Hall, London, UK.
- Shukla, S. K., and Awasthi, S. K. 2013.** Sugarbeet: A supplement to sugarcane in non-traditional areas to meet future sugar demand. Souvenir- IISR-Industry Interface on Research and Development Initiatives for Sugarbeet in India, 28-29 May, Sugarbeet Breeding Outpost of IISR IVRI Campus, Mukteswar-263138, Nainital. Organised by Indian Institute of Sugarcane Research (ICAR) and Association of Sugarcane Technologists of India. pp. 55-57.
- Singh Brar, N., Singh Dhillon, B., Saini, K. S., and Sharma P. K. 2015.** Agronomy of sugarbeet cultivation. A review. Agricultural Reviews 36 (3): 184-197.
- Smith, G. A., and Martin, S. S. 1997.** Effects of plant density and nitrogen fertility on purity components of sugar beet. Crop Science 17: 479-172.
- Smith, G. A., Martin, S. S., and Ash, K. A. 1977.** Path coefficient analysis of sugarbeet purity components. Crop Science 17: 249-253.
- Smith, L. 1979.** Plant population effects on sugarbeet yield and quality factors. Sugar Beet Research and Extension Reports 10: 189-192.
- Sogut, T., and Aroglu, H. 2004.** Plant density and sowing date effects on sugarbeet yield and quality. Journal of Agronomy 3(3): 215-218.
- Stibbe, C., and Marlander, B. 2002.** Field emergence dynamics significance to intraspecific competition and growth efficiency in sugar beet (*Beta vulgaris* L.). European Journal of Agronomy 17: 161-171.
- Vandendriessche, H. J. 2000.** A model of growth and sugar accumulation of sugar beet for potential production conditions: SUBEMOpo. I. Theory and model structure. Agricultural Systems 64: 1-19.
- Wyse, R. 1979.** Parameters controlling sucrose content and yield of sugar beet roots. Journal of the American Society of Sugar Beet Technologists 20(4): 268-385.